Biolchim
Concimi speciali

la valeur de l'expérience
la force de l'innovation

BLU PRINS®

agent de levée de dormance

AVANCE ET HOMOGÉNÉISE LE DÉBOURREMENT ET LA FLORAISON DU CERISIER ET DU RAISIN DE TABLE ET DU KIWI

RÉDUIT LE NOMBRE DE BOURGEONS NON DÉBOURRÉS

Au début de la saison froide, les bourgeons arrêtent leur développement et entrent dans la dormance, qui se termine lorsque les plantes ont reçu un nombre suffisant d'heures de froid. **BLU**PRINS est spécialement étudié pour arrêter la dormance et promouvoir l'uniformité de débourrement dans les climats chauds, où le démarrage des bourgeons est réduit et irrégulier.

Avec **BLU**PRINS, les bourgeons sortent de la dormance et sont activés tous en même temps, optimisant et homogénéisant les phases suivantes de floraison, nouaison et maturation des fruits.

FORMULATION TRÈS CONCENTRÉE EN GEL

NON TOXIQUE POUR L'OPÉRATEUR

LARGE FENÊTRE D'APPLICATION

MÉLANGER TOUJOURS AVEC BLU ACT®

Biolchim
Concimi speciali

la valeur de l'expérience
la force de l'innovation

ESSAIS EXPERIMÉNTAUX

1.

CERISIER

variété:
Symphonie

localité:
Oulmes, (Maroc)

2.

RAISIN DE TABLE

variété:
Victoria

localité:
Sicile, (Italie)

COMPOSANTS

Acides aminés, Polysaccharides, Azote, Calcium.

COMPOSITION

	BLUPRINS p/p	BLUACT p/p
Azote (N) total	%8,7	%15
Azote (N) organique	%0,7	/
Azote (N) nitrique	%4	%9
Azote (N) ammoniacal	%4	%6
Carbone (C) organique	%5,5	/
Oxyde de calcium (CaO)	/	%7

BLUPRINS doit être toujours mélangé avec **BLUACT**

EMBALLAGE

BLUPRINS: 20–5L
BLUACT: 200–20L

MODE ET DOSES D'APPLICATION

Pulvérisation sur arbre en hiver.

- **VIGNE DE TABLE:** un traitement environ 30–40 jours avant le débourrement, **BLU**PRINS %6 + **BLU**ACT %20, en utilisant 600 L de solution par ha.
- **VIGNE DE CUVE:** un traitement environ 30–40 jours avant le débourrement, **BLU**PRINS %6 + **BLU**ACT %20, en utilisant 400-300 L de solution par ha.
- **PÊCHER, NECTARINIER, CERISIER:** un traitement environ 30–40 jours avant floraison **BLU**PRINS %4 + **BLU**ACT %15, en utilisant 800L de solution par ha.
- **KIWI:** un traitement environ 30–40 jours avant le débourrement **BLU**PRINS %6 + BLUACT %20, en utilisant 600L de solution par ha.

Pour une solution de 100 L, dans le cas de la vigne, mélanger 6 L BLUPRINS + 20 L BLUACT + 74 L eau.

ATTENTION

- Ne pas utiliser sur plantes de moins de 3 ans.
- Utiliser en localités avec un nombre d'heures de froid (T <°7,2 C) moins que 500.
- Peut causer phytotoxicité sur les plantes pas bien lignifiées et sur les plantes faibles.
- Les possibles traitements avec les huiles minérales à effectuer au moins 10/8 jours après l'application de **BLU**PRINS + **BLU**ACT.
- Ne pas l'utiliser avec des températures inférieures à °5C.
- Évitez le contact, même de la dérive, avec les cultures à feuillage persistant (olivier, agrumes, etc).

BIOLCHIM S.p.A.
Via San Carlo, 2130 I 40059 Medicina (BO)
Tel. 051 6971811 I Fax 051 852884
biolchim@biolchim.it I **www.biolchim.it**

CASEM

Casablanca(siège social)
+212 5 22 90 43 24
Had Soualem
+212 5 29 04 85 10 /08
Moulay Bousselham
+212 5 37 44 08 13
Meknès / Oriental
+212 5 35 51 79 19
Agadir / Marrakech
+212 5 28 24 90 39/71